



Bulletin technique de la Chambre d'Agriculture de région Alsace

N°9 du 23 avril 2014 – 2 pages

GRANDES CULTURES

FLASH' CULTURES

Les précipitations sont toujours capricieuses et très souvent insuffisantes. Durant le week-end pascal, elles ont souvent été limitées à quelques petits millimètres. Très localement on signale des précipitations de 10 à plus de 15 mm.

Maïs

Alors que dans les situations les plus critiques les semis ne sont toujours pas possibles, les maïs atteignent le stade « 2 feuilles » dans les situations les plus précoces.

Dans les parcelles où les sols sont hétérogènes, les levées le sont également, mais globalement sur cette première phase, les levées sont plutôt homogènes.

On note localement un brunissement des feuilles, dû à des températures proches de 0° C. Pas de perte de rendement à prévoir, seules les feuilles présentes sont détruites ; de nouvelles feuilles vont apparaître !

MAIS

Semis et désherbage : toujours compliqués.

BLE

Pas de traitement fongicide à envisager.

Semis

Des semis restent à réaliser dans des parcelles difficiles à travailler. Dans les rares parcelles où la pluie a été supérieure à 10 mm, il est important de travailler les sols tant que l'humidité est présente pour casser le maximum de mottes avec un outil animé par exemple. Pour les parcelles encore très motteuses et où il n'a pas plu suffisamment, le recours à la herse rotative peut être une solution mais le résultat sera limité.



Désherbage

Les premières levées d'adventices sont observées. Ces plantules sont pour la plupart issues de graines profondes (4-5 cm). Les levées risquent donc d'être très hétérogènes sauf sur les parcelles irriguées. Les précipitations même limitées vont probablement permettre une levée plus significative dans les jours à venir.

Nom des rédacteurs : Alain Weissenberger – Félix Meyer – Benoît Gassmann

(*) La Chambre d'agriculture de région Alsace est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF 01762 dans le cadre de l'agrément multi-sites porté par l'APCA.

Chambre d'agriculture de région Alsace

■ Siège et Site du Bas-Rhin

2 rue de Rome - BP 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cédex

■ téléphone : 03 88 19 17 17 ■ fax : 03 88 83 30 54

■ mail : direction@alsace.chambagri.fr ■ Site internet : www.alsace.chambagri.fr

■ Heures d'ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

■ Site du Haut-Rhin

11, rue Jean Mermoz - BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE

■ téléphone : 03 89 20 97 00 ■ fax : 03 89 20 97 01

On note également la présence de vivaces (liseron mais aussi chardon) dans les parcelles.

Préconisations

En situation arrosée, sur les maïs qui ont atteint le stade 2 feuilles, il est possible d'envisager le désherbage de post précoce. Attention cependant à calibrer les doses en fonction du stade des adventices les plus développés. L'association d'herbicides racinaires (Camix, Adengo, Dual Gold, Isard...) peut être intéressante mais nécessite des sols humides pour être efficace. Dans les autres situations, on a intérêt à attendre une levée plus importante des adventices, et à moduler, par la suite, les doses d'herbicides en se calant sur les adventices les plus avancées.

Il est trop tôt pour envisager de désherber les vivaces.

Blé

L'essentiel des parcelles de blé ont maintenant atteint voir dépassé le stade 2 nœuds. Dans les situations les plus critiques le manque d'eau commence à se faire sentir

Maladies

La situation sanitaire reste toujours très saine. Les quelques précipitations enregistrées n'ont pas permis une augmentation significative du risque actuel et prévisionnel.

Préconisations

Aucun traitement fongicide n'est à envisager pour l'instant.

Orge

Les barbes sont visibles dans presque toutes les parcelles.

Maladies foliaires

Les quelques pluies éparses ont pu être contaminatrices. Des symptômes de rhynchosporiose et d'helminthosporiose sont observés dans de nombreuses parcelles du réseau BSV, sur les feuilles basses.

Même si le temps reste globalement sec, les précipitations annoncées vont favoriser le développement et la progression des maladies sur le haut des plantes.

Préconisations

Envisager un traitement fongicide efficace sur les maladies foliaires de l'orge dès le stade sortie des barbes.